



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



**WINROCK**  
INTERNATIONAL

ကျင်းသီးနံ ဝိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု အတွက်  
ကောင်းမွန်သော ဝိုက်ပျိုးရေး အလေ့အကျင့်များ

Ginger Good Agricultural Practices for smallholder farmers in Southern Shan, Myanmar



ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကုန်စည်တန်ဖိုးမြှင့်ကွင်းဆက်များစီမံကိန်း

ယခုလက်စွဲစာစောင်အား အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတကာ  
စွံ့ဖြိုးရေး အေဂျင်စီ (USAID) မြန်မာ နှင့်  
အမေရိကန် ပြည်သူများ၏ ကူညီထောက်ပံ့မှုဖြင့်  
အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည်။ ယခုစာစောင်တွင် ပါရှိသော  
အကြောင်းအရာ များသည် Winrock International ၏ တာဝန်သာဖြစ်ပြီး  
USAID (သို့) အမေရိကန်အစိုးရ၏ ထင်မြင်ယူဆချက်များ မပါဝင်ပါ။

Winrock International ကျေးလက်ဒေသစွံ့ဖြိုးရေးအတွက်  
ကုန်စည်တန်ဖိုးမြှင့် ကွင်းဆက်စီမံကိန်းမှ မတ်လ၊ ၂၀၁၇  
ခုနှစ် တွင် ထုတ်လုပ် ဖြန့်ချိသည်။

ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာ

VCRD တောင်ကြီးရုံး -၀၈-၂၁၂၃၀၂၂

VCRD ရန်ကုန်ရုံး -၀၁-၂၃၃၂၀၈၈

# မာတိကာ

အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။ စိုက်ပျိုးမြေရွေးချယ်ခြင်းနှင့် မြေပြုပြင်ခြင်း	၅-၆
၂။ ဂျင်းတက် ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်း	၇-၈
၃။ ပင်ကြားတန်းကြား နှင့် စိုက်ပျိုးစနစ်	၉-၁၀
၄။ မြေဩဇာ ကျေးခြင်း နှင့် ဘောင်တင်ခြင်း	၁၁-၁၄
၅။ ဂျင်းသီးနှံအတွက် သီးညှပ်စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် အရိပ်	၁၅-၁၆
၆။ ရောဂါများနှင့် ကာကွယ်နည်းများ	၁၇-၂၀

အမည် .....

ကျေးရွာ.....

မြို့နယ်.....

# ၁။ စိုက်ပျိုးမြေရွေးချယ်ခြင်းနှင့် မြေပြင်ခြင်း

## ကျန်းမာသော မြေသည်

## ကျန်းမာသော ဂျင်းကို ရရှိစေသည်။

### စိုက်ပျိုးမြေရွေးချယ်ခြင်း

- ဂျင်းသီးနှံသည် ရေမဝင်သော သဲနုနု၊ ရွှံ့နုနု နှင့် တောင်ပေါ်မြေနီ အမျိုးအစား မြေများ၌ ကောင်းစွာဖြစ်ထွန်းသည်။
- ဂျင်းစိုက်မည့် မြေကွက်သည် ဥပုပုရောဂါ ကျရောက်ဖူးသော မြေမဖြစ်ရ။
- ရောဂါကျရောက်လွယ်သော အာလူး၊ ခရမ်းချဉ်၊ ငရုတ်၊ ခရမ်း၊ ဂေါ်ဖီထုပ် စသော သီးနှံများတွင် ကျရောက်သော ဘက်တီးရီးယားများသည် ဂျင်းခင်းတွင် ကျရောက်နိုင်သော ကြောင့် ဂျင်းစိုက်မည်ဆိုပါက ၎င်းသီးနှံစိုက်ထားသော မြေမဖြစ်ရပါ။
- ဂျင်းသီးနှံကို အရိပ် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ရရှိနိုင်သော သရက်၊ ထောပတ် စိုက်ခင်းများ၌လည်း စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။



# မြေပြင်ခြင်း



- တောင်စောင်းဒေသများ၌ ဂျင်းစိုက်ပျိုးမည်ဆိုပါက မြေဆီလွှာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရန် ကွန်တို စနစ်ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။
- အမြစ် နှင့် ဥ များကောင်းစွာ ဖွံ့ဖြိုး စေရန်အတွက် ၈-၁၀ လက်မရှိ ထယ်ရေးနက်နက်ထယ်ရန် လိုအပ်သည်။ စိုက်ကြောင်း တစ်ခု နှင့် တစ်ခုကြား ၃ ပေခြားရန် လိုအပ်သည်။



- ဂျင်းစိုက်မြောင်းများပြုလုပ်ရန်နှင့် မြေ သားကောင်းကောင်းရရှိရန် အတွက် အနည်းဆုံး ထယ် ၂ ကြိမ် နှင့် ထွန် ၂ ကြိမ် ဝင်ရန်လိုအပ်သည်။

# ၂။ မျိုးဂျင်းတက် ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်း

ကျန်းမာသော မျိုးဂျင်း တက်များကို ဂရုတစိုက် ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့် ဂျင်းရောဂါကျရောက်မှု အန္တရာယ်ကို ၈၀% သက်သာစေပါသည်။

- ကောင်းမွန်သော ဂျင်းမျိုးတက်များ ရရှိရန် ဂျင်း တူးဖော်ရက်သိမ်းချိန်၌ ဥမ နှင့် ဂျင်းဥ မပုပ်သော ဂျင်းခက်များကို ရွေးချယ်ရန် လိုအပ်သည်။
- ရွေးချယ်ထားသော မျိုးဂျင်းခက်များကို လာမည့်စိုက်ပျိုးရာသီ အတွက် ခြောက်သွေ့သန့်ရှင်းသော နေရာ၌ သိုလှောင်ထားရန် လိုအပ်သည်။
- ကောင်းစွာရင့်သော၊ သန့်ရှင်းသော၊ ရောဂါကင်းသော မျိုးဂျင်းခက်များ ကိုသာအသုံးပြုရမည်။
- ရွေးချယ်ထားသော မျိုးဂျင်းခက်များကို ၄ ကျပ်သားမှ ၇ ကျပ်သား အရွယ်အစားရှိ ဂျင်းမျိုးတက် များအဖြစ် ပိုင်းဖြတ်ပေးရမည်။
- ဂျင်းမျိုးတက် တစ်ခုချင်းစီ၌ ကောင်းမွန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးသော မျက်စိ ၂ ခုမှ ၄ ခုပါဝင်ရန်လိုအပ်သည်။



# ဂျင်းမျိုးတက်များအား ပိုးသန့်စေရန် စနစ်တကျ ပိုင်းဖြတ်ခြင်း



ကလိုရင်း အရည် ၁ ဆ နှင့် ရေ ၁၀ ဆ ကို ရောစပ်ပါ။  
( ကလိုရင်းပါဝင်သော အိမ်သုံး  
အပတ်အစွန်းချွတ်ဆေးကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်)



ဂျင်းမျိုးတက် ပိုင်းဖြတ်ရာတွင် ပိုးသန့်စင်ထားသော ဓားဖြင့်  
အသုံးပြုရန် လိုအပ်သည်။  
ဂျင်းမျိုးတက်များကို လှီးဖြတ်မည် မိအား  
ပိုးသတ်ရန်အတွက် ရောစပ်ထားသော  
ကလိုရင်းဆေးရည်တွင် ခဏစိမ်ပေးပါ။



ကလိုရင်းဖြင့် ပိုးသတ်ထားသော ဓားဖြင့် မျိုးဂျင်းခက်များကို  
၄ ကျပ်သားမှ ၇ ကျပ်သား အရွယ်အစားရှိ  
ဂျင်းမျိုးတက် များအဖြစ် ပိုင်းဖြတ်ပေးရမည်။



ပိုင်းဖြတ်ထားသော ဂျင်းမျိုးတက်များ၏ ဖြတ်ထားသောနေရာကို  
ပိုးသတ်ရန်အတွက် (ချွတ်ဆေး ၁ ဆ၊ ရေ ၁၀  
ဆ ရောစပ်ထားသော)  
အိမ်သုံးအပတ်အစွန်းချွတ်ဆေး ဖျော်ရည် ၌ ခဏနှစ်ပေးရမည်။


စိမ်ပြီးသော ဂျင်းမျိုးတက်များအား ဖြတ်ထားသော ဒဏ်ရာခြောက်သွေ့စေရန်  
မစိုက်ပျိုးမီအေး၍ခြောက်သွေ့သန့်ရှင်းသော နေရာ၌ အနည်းဆုံး ၃ ရက်မှ ၅ ရက်  
ခန့်ဖြန့်ထား ပြီးနောက် ဒဏ်ရာခြောက်သွေ့သွားသော ဂျင်းမျိုးတက်များသည် စိုက်ပျိုးရန်  
အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။

# ၃။ ပင်ကြားတန်းကြား နှင့် စိုက်ပျိုးစနစ်

တန်းကြား ၃ ပေနှင့် ပင်ကြား ၁ ပေခွဲ နည်းစနစ်  
ကိုအသုံးပြု ရင်းဖြင့်တစ်ဧကလျှင်ဂျင်းမျိုး ပိဿာ ၅၀၀ မျှသာ  
အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံး ၁၅ကျပ်သားအရွယ်အစား  
ပါရှိသော ဂျင်းခက်များကို ၈၀% နှုန်း ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

## ပင်ကြားတန်းကြား

- တန်းကြား ၃ ပေနှင့် ပင်ကြား ၁ ပေခွဲ ရှိရမည်။
- တစ်ဧကလျှင် အပင်ဦးရေ (မျိုးတက်) ၉၆၈၀ ခန့် ရှိရန် လိုအပ်သည်။
- ဂျင်းမျိုးတက်အရွယ်အစားအရ တစ်ဧကလျှင် မျိုးပိဿာချိန် ၄၀၀ မှ ၅၀၀ ခန့် သာကုန်ကျမည်။ မျိုးကုန်ကျစရိတ်ကို ပုံမှန်ထက် ထက်ဝက် လျော့ချနိုင်လိမ့်မည်။



## ဘိုကာရှီ မြေဆွေးမြေထူစာ

- တစ်ဧကလျှင်ဘိုကာရှီ မြေဆွေးမြေထူစာ အိတ် ၆၀ (ပိဿာ ၂၀၀၀ ခန့်) ကို စိုက်မြောင်းများထဲသို့ ထည့်ပေးရမည်။ (တစ်ဧကလျှင် ဘိုကာရှီ မြေထူစာဖိုး ၁၂၀၀၀၀ ကျပ်ကုန်ကျမည်။)

## စိုက်ပျိုးစနစ်

### မြေထူစာ ကျွေးခြင်း

- စိုက်မြောင်းများထဲသို့ မြေဆွေးများထည့်ပြီးပါက မျိုးဂျင်းတက် ချစိုက်မည့်နေရာ၌ တီစူပါ၊ကွန်ပေါင်း မြေထူစာ အရောကို လက်တစ်ဆုပ်ခန့် ဦးစွာ ပုံပေးရမည်။ ၎င်း မြေထူစာ အပေါ်၌ မြေအနည်းငယ် ဖုံးပေးရမည်။ တို့နောက် ၎င်းအပေါ်၌ ဂျင်းမျိုးတက်များ ချစိုက်၍ မြေ ၄ လက်မခန့် အထူ ဖုံးအုပ်ပေးရမည်။

### မြေငွေ့ဖုံးစနစ်အသုံးပြုခြင်း

- ဂျင်းသီးနှံတွင် ပေါင်းပင် ပေါက်ရောက်မှုသက်သာစေရန် ၊ သဘာဝ မြေဆီဩဇာ ကြွယ်ဝစေရန် နှင့် မြေအစိုဓါတ်ကို ထိန်းသိမ်းပေးရန် အတွက် မြေငွေ့ဖုံးစနစ် အသုံးပြုရန် အရေးကြီး သည်။
- မြေငွေ့ဖုံးစနစ်ကို ဒေသထွက်ပစ္စည်းများဖြစ်သော ရောဂါပိုးကင်းသည် ကောက်ရိုး၊ စပါးခွံ၊ ပြောင်းခွံ နှင့် သစ်ရွက်၊ သစ်ကိုင်း တို့ဖြင့် မြေငွေ့ဖုံးရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။
- မြေငွေ့ဖုံးစနစ်ကို အသုံးပြုမည်ဆိုပါက ဂျင်းစိုက်ပြီးသည် အချိန်တွင် တစ်ကြိမ် နှင့် ဘောင်တင်ပြီးသည် အချိန်တွင် တစ်ကြိမ်ဖုံးအုပ်ပေးရပါမည်။
- မြေအမျိုးအစားသည် တောင်စောင်းမြေဖြစ်ပါက မြေငွေ့ဖုံးခြင်းကို ဂျင်းဥမ ဖော်ပြီးသည် အချိန်တွင် တစ်ကြိမ်ထပ်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပြီး မြေအမျိုးအစားသည် မြေပြန့် ဖြစ်ပြီး ရေဝသော အခြေအနေ နှင့် ရွှံ့စေးမြေအမျိုးအစားဖြစ်ပါက ဂျင်းဥမဖော်ပြီးချိန်တွင် မြေဖုံးခြင်းကို ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရန် မလိုပါ။



ကောက်ရိုးဖုံးခြင်း နည်းလမ်းဖြင့် စိုက်ပျိုးထားသော ဂျင်းသည် အထွက်နှုန်း ၂ ဆ ထွက်ရှိနိုင်သည်။

# ၄။မြေဩဇာ ကျေးဇြင်း နှင့် ဘောင်တင်ခြင်း

## ဂျင်းသီးနှံသည် အစာအာဟာရ စားသုံးမှု များများလိုအပ်သောသီးနှံဖြစ်သည် ။

- စိုက်ပျိုးချိန်တွင် တစ်ဧကလျှင် တီစူပါ (၄၆ %) ၂ အိတ် နှင့် ၁၅:၁၅:၁၅ အချိုး ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ အိတ် ထက်ဝက် အသုံးပြုရမည်။ တစ်ဧကအတွက် ဓာတ်မြေဩဇာဖိုး ၆၇၀၀၀ ကျပ်ကုန်ကျမည်။
- အပင်စပေါက်ပြီး ၃ ပတ်ခန့်အကြာတွင် တစ်ဧကလျှင် ပုလဲမြေဩဇာ ၁ အိတ်နှုန်း ထည့်ရန် လိုအပ်သည်။ နောက်တစ်လ အကြာတွင် တစ်ဧကလျှင် ပုလဲမြေဩဇာ ၁ အိတ်နှုန်းထပ်ထည့်ရန် လိုအပ်သည်။ တစ်ဧကလျှင် ပုလဲမြေဩဇာဖိုး- ၄၄၀၀၀ ကျပ်ကုန်ကျမည်။
- ဘောင်တင်ချိန်တွင် တစ်ဧကလျှင် ပိုတက်စီယမ် ဓာတ်မြေဩဇာ ၂ အိတ်ထည့်ရန်လိုအပ်သည်။ တစ်ဧကလျှင် မြေဩဇာဖိုး- ၅၆၀၀၀ ကျပ်ကုန်ကျမည်။



**အရည်သွေးမီ ဂျင်းစိုက်ပျိုးသည့်နည်းစနစ် အတွက် အပင်သက်တမ်းအလိုက်  
မြေဩဇာထည့်ရမည့်ရက် နှင့် အသုံးပြုရမည် မြေဩဇာများ**

ရက်စွဲ	အပင် သက် တမ်း	မြေဩဇာအမျိုးအစား	ပမာဏ	ထည့်ရမည့်နေရာ
ဧပြီ ၁ ( စိုက်သည့် အချိန်)		မြေဆွေး	စိုက်မြောင်း ၁၃ပေ တိုင်းတွင် မြေဆွေး ၁ပိဿာ ၂၅ ကျပ်သားခန့် ထည့်ရန်	စိုက်မြောင်းတွင် မျိုးရင်းတက် မထည့်မီ ထည့်ရန်
ဧပြီ ၁ ( စိုက်သည့် အချိန်)		တီစူပါ၊ တီစူပါ မရှိပါက P205 ( ၁၅ ဂရမ် ) + ၁၅-၁၅-၁၅ N-P-K (၅ ဂရမ်)	တစ်ပင်လျှင် ၂၀ ဂရမ် (ဟင်းရည်သောက်ခွန်း ၂ ခွန်းခန့်)	တီစူပါနှင့် N-P-K ကွန်ပေါင်း အရောကို မျိုးရင်းတက်ရမည့်နေရာ မြေဆွေးအပေါ်တွင်ထည့်ပါ။ စိုက်မြောင်းထဲသို့ မျိုးရင်းတက်မထည့်မီ မြေဩဇာပေါ်တွင် မြေအနည်း ပုံပါ။
မေလ ၁၅	၆ ပတ်	ပုလဲ( နိုက်ထရိုဂျင် ၄၆%) သို့မဟုတ် အခြား နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ် များစွာပါဝင်သော မြေ ဩဇာများ	တစ်ပင်လျှင် ၁၅-၂၀ ဂရမ်နှုန်း	အပင်မြေပတ်လည် ပင်စည်နှင့် မနီးကပ်လွန်းသော နေရာတွင်ထည့်ပါ။ ထည့်ပြီးနောက် မြေဩဇာကို မြေကြီးပြန်ပုံပါ။ (သို့မဟုတ်) ပေါင်းရင်းသည် အချိန်တွင် မြေဩဇာထည့်ခြင်းကို တစ်ခါတည်းလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ဇူလိုင် ၁	၁၂ ပတ်	ပိုတက် (သို့) ပိုတက်နှင့်ပုလဲ	တစ်ပင်လျှင် ၂၀ ဂရမ်နှုန်း ( ပိုတက် ၁၅ ဂရမ်+ ပိုလဲ ၅ ဂရမ်)	အပင်မြေပတ်လည် ပင်စည်နှင့် မနီးကပ်လွန်းသော နေရာတွင်ထည့်ပါ။ ထည့်ပြီးနောက် မြေဩဇာကို မြေကြီးပြန်ပုံပါ။ (သို့မဟုတ်) ပေါင်းရင်းသည် အချိန် နှင့် ဘောင်တင်သည်၊ အချိန်တွင် မြေဩဇာထည့်ခြင်းကို တစ်ခါတည်းလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ဇူလိုင် ၁၅	၁၄ ပတ်	ရွက်ချွန်းမြေဩဇာ သို့ မြေဆွေးရည်	အသုံးပြုသည့် ရွက်ချွန်းမြေဩဇာသို့ မြေဆွေးရည် အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍	ရွက်ချွန်းမြေဩဇာရရှိခြင်းသည် ရွက်ပြောက်ရောဂါတိန်းချုပ်ရန်နှင့် အစာအာဟာရ အတွက် ကောင်းမွန်သောအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။
စက်တင် ဘာ ၁	၂၀ ပတ်	ပိုတက်	တစ်ပင်လျှင် ၁၅ ဂရမ်နှုန်း	အပင်မြေပတ်လည် ပင်စည်နှင့် မနီးကပ်လွန်းသောက နေရာတွင်ထည့်ပါ။ ထည့်ပြီးနောက် မြေဩဇာကို မြေကြီးပြန်ပုံပါ။ (သို့မဟုတ်) ပေါင်းရင်းသည် အချိန် နှင့် ဘောင်တင်သည်၊ အချိန်တွင် မြေဩဇာထည့်ခြင်းကို တစ်ခါတည်းလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

ခါတုခေးဂါးအသုံးနည်းသည်, ဂျင်းစိုက်ပျိုးသည့်နည်းစနစ်အတွက် အပင်သက်တမ်းအလိုက်

မြေဩဇာထည့်ရမည့်ရက် နှင့်, အသုံးပြုရမည့်,မြေဩဇာများ

ရက်စွဲ	အပင်သက်တမ်း	မြေဩဇာအမျိုးအစား	ပမာဏ	ထည့်ရမည့်နေရာ
ဧပြီ ၁ (စိုက်သည့်အချိန်)		မြေခွေး	စိုက်မြောင်း ၁၃ပေ တိုင်းတွင် မြေခွေး ၁ပီသော ၂၅ ကျပ်သားခန့်, ထည့်ရန်	စိုက်မြောင်းတွင် ဖျိုးချင်းတက် မထည့်,ပီထည့်,ရန်
မေလ ၁၅	၆ ပတ်	ဘိုကာရီ သဘာဝမြေဩဇာ	တစ်ပင်လျှင် ၂၀ ဂရမ်နှုန်း (ဟင်းဆည်သောက်ခွန်း ၂ ခွန်းခန့်)	အပင်မြေပတ်လည်တွင်ထည့်ပါ။ ပေါင်းရှင်းသည်,အချိန်တွင် မြေဩဇာထည့်ခြင်းကို တစ်ခါတည်းလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ဇွန်လ ၁၅	၁၀ ပတ်	ဘိုကာရီ သဘာဝမြေဩဇာ	တစ်ပင်လျှင် ၂၀ ဂရမ်နှုန်း (ဟင်းဆည်သောက်ခွန်း ၂ ခွန်းခန့်)	အပင်မြေပတ်လည် တွင်ထည့်ပါ။ ထည့်ပြီးနောက် မြေဩဇာကို မြေကြီးပြန်နံ့ပေးပါ။ (သို့မဟုတ်) ပေါင်းရှင်းသည်,အချိန်တွင် မြေဩဇာထည့်ခြင်းကို တစ်ခါတည်းလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ဇူလိုင် ၁၅	၁၄ ပတ်	ပိုတက် (ပိုတက်ခါတ်ပါဝင်သော သဘာဝမြေဩဇာများလည်း ပို့ပါသည်။)	တစ်ပင်လျှင် ၂၀ ဂရမ်နှုန်း (ဟင်းဆည်သောက်ခွန်း ၂ ခွန်းခန့်)	အပင်မြေပတ်လည် တွင်ထည့်ပါ။ ထည့်ပြီးနောက် မြေဩဇာကို မြေကြီးပြန်နံ့ပေးပါ။ (သို့မဟုတ်) ပေါင်းရှင်းသည်,အချိန်တွင် မြေဩဇာထည့်ခြင်းကို တစ်ခါတည်းလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ဩဂုတ် ၁	၁၆ ပတ်	ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ သို့ မြေခွေးရည်	အသုံးပြုသည့် ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာသို့ မြေခွေးရည် အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍	ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာဖျန်းခြင်းသည် ရွက်ပြောက်ရောဂါတိန်းချုပ်ရန်နှင့် အစာအာဟာရအတွက် ကောင်းမွန်သောအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။
စက်တင်ဘာ ၁	၂၀ ပတ်	ပိုတက်	တစ်ပင်လျှင် ၁၅ ဂရမ်နှုန်း	အပင်မြေပတ်လည် ပင်စည်နှင့် မနီးကပ်လွန်းသော နေ့တွင်ထည့်ပါ။ ထည့်ပြီးနောက် မြေဩဇာကို မြေကြီးပြန်နံ့ပေးပါ။ သို့မဟုတ် ပေါင်းရှင်းသည်,အချိန်နှင့်, ဘောင်တင်သည်, အချိန်တွင် မြေဩဇာထည့်ခြင်းကို တစ်ခါတည်းလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
စက်တင်ဘာ ၁၅	၂၂ ပတ်	ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ သို့ မြေခွေးရည်	ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ သို့ မြေခွေးရည် အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍	ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာဖျန်းခြင်းသည် ရွက်ပြောက်ရောဂါတိန်းချုပ်ရန်နှင့် အစာအာဟာရအတွက်ကောင်းမွန်သောအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။

## ဘောင်တင်ခြင်း

- ပုံမှန်ဘောင်တင်ပေးခြင်း အားဖြင့် အရွယ်အစား ကြီးမားသော ဂျင်းထွက်နှုန်းကို မြင်မားစေပါသည်။
- နောက်ဆုံးအကြိမ် ဘောင် တင်ပြီး ပါကဘောင်အမြင့် ၁ ပေခွဲ ရှိရမည်။
- ဘောင်တင်ချိန်၌ ဂျင်းဥတက်များ မထိခိုက်အောင် ဂရုတစိုက် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်။



# ၅။ ဂျင်းသီးနှံအတွက် သီးညှပ်စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် အရိပ်

ဂျင်းသီးနှံကို သီးညှပ်စိုက်ပျိုးခြင်း (သို့) သစ်တော နှင့် ရောနှော စိုက်ပျိုးခြင်း ဖြင့် အရိပ် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းပေးခြင်းသည် ဂျင်း၏ အရောင်အသွေး နှင့် အထွက်နှုန်းကို တိုးစေသည့်အပြင် အရိပ်ရသီးနှံမှ အပိုဝင်ငွေကိုလည်း ရရှိစေသည်။

## သီးညှပ်စိုက်ပျိုးခြင်း



- ဂျင်းစိုက်ခင်း၌ ပဲစဉ်းငုံ သီးညှပ်စိုက်ပျိုးခြင်းသည် ဂျင်းပင်အတွက် အရိပ်ရစေရုံသာမက ပဲမျိုးရင်းဝင်ဖြစ်သောကြောင့် လိုအပ်သော နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ကိုပါ ရရှိစေနိုင်သည်။
- (ဂျင်း ၄ တန်းလျှင် ပဲစဉ်းငုံ ၁ တန်းဖြင့် သီးညှပ်စိုက်ပျိုးပါ။)
- အခြားအရိပ်ရရှိစေနိုင်သော ပြောင်းနှင့် ပဲမျိုးရင်းဝင် အပင်များကိုလည်း အရိပ် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ရရှိစေရန် ဂျင်း ၄ တန်းလျှင် သီးညှပ် ၁ တန်း စိုက်ပျိုးပါ။

## သစ်တော နှင့် သီးနှံရောနှော စိုက်ပျိုးခြင်း

- သစ်တောနှင့် သီးနှံ ရောနှောစိုက်ပျိုးခြင်းဆိုသည်မှာ သရက်၊ထောပတ်၊ငှက်ပျော သဘော စသည့် နှစ်ရှည်ပင်များနှင့် သီးနှံပင် များကိုတွဲဖက် စိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်သည်။
- တောင်တန်း ဒေသများတွင် သစ်တောနှင့်သီးနှံ ရောနှောစိုက်ပျိုးခြင်းစနစ်သည် ဂျင်းသီးနှံ အတွက်အထူးသင့်လျော်ပြီး ဂျင်းသီးနှံ အတွက် အရိပ် ရရှိစေသည့်အပြင် ရေရှည်တည်တံ့သော ဂျင်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသည်။



# ၆။ ရောဂါများနှင့် ကာကွယ်နည်းများ

## အဓိက ကျရောက်သောရောဂါများ

### နီမတုတ်ရောဂါ

ရောဂါလက္ခဏာမှာ

အများအားဖြင့် နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါအဖြစ် တွေ့ရသည်။

နီမတုတ်ပိုး ကျရောက်ပါက ဘက်တီးရီးယား၊ မှို နှင့် အခြား

အဆွေးစားကပ်ပါး ပိုးမွှား များဝင်ရောက်ရန် လွယ်ကူစေသည်။

နီမတုတ်ရောဂါကျရောက်ပါက အပင်ပေါက်နှုန်းကို

သိသာစွာ လျော့ကျစေပါသည်။



### ဘက်တီးရီးယား ပင်ညှို့၊ ဥပုပ်ရောဂါ

ရောဂါလက္ခဏာများမှာ ရှုတ်တရက် အပင်ညှို့သွားပြီး

ပင်အောက်ခြေမှ စတင်ပါ၍ ခြောက်သွားခြင်း တို့ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်

အမြစ်နှင့် မျိုးဥပ များအညှို့ရောင်ပြောင်း၍

ပုပ်သွားခြင်း ဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပြီး ရောဂါစဖြစ်သော နေရာ

တစ်ဝိုက်တွင် ရေစိုနာ အရစ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ အနံ့စူးရှခြင်း၊ ဆွဲနှုတ်ပါက

အပင် အလွယ်တကူ ပါလာခြင်း များကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။

အပင်များသည် လျင်မြန်စွာ ခြောက်သွေ့သွားပြီး အရွက်များသည်

အဝါရောင်မှ အညှို့ရောင်သို့ ၃၊ ၄

ရက်အတွင်း ပြောင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။



### ဖျူမီရီယပ် ပင်ညှို့၊ ဥပုပ်ရောဂါ

ရောဂါလက္ခဏာများမှာ အစိမ်းရောင် အညှို့များရှိနေသော်လည်း

အပင်ပု၍ ပါနေခြင်း၊ ရွက်ဖျားများ ခြောက်နေခြင်း

တို့ဖြစ်သည်။ အောက်ခြေတွင်ရှိသော အရွက်များသည်

တဖြည်းဖြည်းခြင်း အဝါရောင်ပြောင်းလာသည်ကို တွေ့ရမည်။



ဂျင်းဥပုင်ရောဂါ ကျရောက် ပါက မည်သည် ပိုးသတ်ဆေး၊  
 မှိုသတ်ဆေးမှ ဂျင်းဥပုင်ရောဂါကို မကာကွယ်နိုင်ပါ ၊  
 မနှိမ်နင်းနိုင်ပါ။ ရောဂါမကျရောက်စေရန် အောက်ပါ  
 နည်းလမ်းအချို့ဖြင့် ကာကွယ် ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။

### ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ

- ရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းရန်အတွက် အရေးကြီးသည် ဂရုစိုက်ရမည်။ အချက်များမှာ ကျန်းမာသော ဂျင်းမျိုးတက် ရရှိရန် အားထုတ်ခြင်း၊ ကျန်းမာသော စိုက်ပျိုးမြေ ဖြစ်စေရန် ပြုစု ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပေါင်းထိန်းချုပ်ခြင်း နှင့် ဂျင်းစိုက်ခင်း ရေမဝပ်စေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းများဖြင့် ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
- ရောဂါကင်းသော မျိုးကောင်းမျိုးသန့် သုံးစွဲခြင်းသည် အရေးကြီးသော ကာကွယ်ကုသ နည်းဖြစ်သည်။ ရောဂါကင်းသော ဂျင်းမျိုးများ ရရှိရန် အတွက် ရောဂါကျရောက်မှု မရှိသေးသော နေရာ များ၌ မျိုးသီးသန့် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရန် အရေးကြီးသည်။
- ဂျင်းစိုက်ခင်းအတွင်း ရေဝပ်၊ ရေအောင်းခြင်း မရှိစေရန် သင့်တော်သော ရေနုတ်မြောင်း ပြုလုပ်ပေးရန် ရန်လိုအပ်သည်။
- ဂျင်းစိုက်ခင်းတွင် ပေါင်းမြက်ကင်းအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်။
- ရောဂါကျရောက်နေသော အပင်အပိုင်းအစများကို စုဆောင်း၍ မီးရှို့ ဖျက်ဆီးရမည်။
- ရောဂါပြန့်ပွားမှု မရှိစေရန် ၎င်း ရောဂါကျရောက်သော ဂျင်းစိုက်ခင်း များကို သီးသန့်ခွဲခြား၍ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရမည်။
- ပိုးသတ်ဆေး၊ မှိုသတ်ဆေးများ ကို ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအတွက် မသုံးပါနှင့်။ ပိုးသတ်ဆေးများသည် ပိုးများကို နှိမ်နင်းနိုင်မည် မဟုတ်သည်။ အပြင် လူကိုပါ ဘေးဖြစ်စေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။

# လူ၊ ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် စိုက်ပျိုးမြေကို အန္တရာယ် မဖြစ်စေဘဲ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို လျော့ချနိုင်သော ကာကွယ်နည်းလမ်းများ

ထရိုင်ဂိုဒီးမားမှိုကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မှိုကြောင့်ဖြစ်သော ဂျင်းအပင်ပုပ်ရောဂါကို ကာကွယ်ခြင်း

- ထရိုင်ဂိုဒီးမားမှိုကို အသုံးပြုရန်အတွက် ဖွဲနနှင့် (၁)ဆ : (၄)ဆ အချိုးဖြင့် သမအောင်နယ်ပြီး အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ဧက အတွက် ထရိုင်ဂိုဒီးမားမှို (၈-၁၀) ကီလို (၁၃-၁၆ပိဿာ ) နှင့် ဖွဲန ၃၂-၄၀ ကီလို (၅၀-၆၅ ပိဿာ ) လိုအပ်ပါသည်။
- တစ်ဧကအတွက် ထရိုင်ဂိုဒီးမားမှို ကုန်ကျစရိတ် ၂၆၀၀၀-၃၃၀၀၀ ကျပ်ကုန်ကျပါသည်။ ထရိုင်ဂိုဒီးမားကို စိုက်ခင်း၌ထွန်းမွှေသည့်အချိန် ၌လည်းကောင်း စိုက်မြောင်းထဲသို့လည်းကောင်း ထည့်၍ မြေခံအဖြစ် အသုံးပြုပါသည်။



## တမာဆီ ဖြင့် ဝိုးမွှားကာကွယ်နိုင်နင်းခြင်း

- တမာဆီ ဖျန်းခြင်းကို မနက်အစောပိုင်း သို့မဟုတ် ညနေခင်း အချိန်တို့တွင်ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ ရာသီဥတု ပူပြင်းပါက ဆေးဖျန်းသည့် အကြိမ်အရေအတွက် ကို တိုးမြှင့်သင့်သည်။ ဆောင်းတွင်းတွင် ၁၀ ရက် လျှင် တစ်ကြိမ် ဖျန်းပါက မိုးတွင်းတွင် နေ့စဉ်ဖျန်းသင့်သည်။
- အင်းဆက်ဝိုးများသည် အရွက်မျက်နှာပြင်အောက်တွင် ဥများဥသောကြောင့် အရွက်အောက်ပိုင်းများကို လည်း ဆေးဖျန်းပေးသင့်သည်။
- ဆေးဖျန်းစက်အသုံးပြုပြီး ဆေးဖျန်းမည်ဆိုပါက ရေပမာဏကို တစ်ဝက်သာ အသုံးပြုသင့်သည်။
- ပြင်းအား နည်းသော အဆီများကိုသာ မကြာခင် အသုံးပြုသင့်သည်။
- ယေဘုယျ လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုအနေဖြင့် တစ်ဧက လျှင် အဆင်သင့်ဖျော်စပ်ထားသော ဖျော်ရည် ၆၀ လီတာ(အပြင်းစား အဆီမဟုတ်ပါ) ဖျန်းနိုင်ပါသည်။ ဝိုးမွှားကျရောက်မှု အနည်းအများ အနေအထားပေါ်မူတည်ပြီး အသုံးပြုမည့်ပမာဏကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။









